

# Alerta: Se encontraron comprimidos de prescripción falsificados peligrosos en Ohio

En Ohio se venden comprimidos de prescripción falsificados/falsos que se ven como alprazolam (Xanax®) y oxicodona (Oxycontin®). Contienen fentanilo, una poderosa droga que puede matar y otros componentes que podrían causar la muerte.

Las marcas de letras y números, los colores y las líneas de clasificación en las píldoras falsas hacen que parezcan idénticas a las píldoras reales/legítimas. Es casi imposible distinguir la diferencia a simple vista.

Los comprimidos falsos **no** están siendo entregados por proveedores de atención médica con licencia. A menudo se venden en línea a través de redes sociales o en sitios web ocultos en la "web oscura" y también se venden de persona a persona por vendedores que afirman que son reales.

**NUNCA tome un comprimido o cualquier medicamento de prescripción que no sea de un proveedor de atención médica con licencia.**

**Nota: Los niveles de drogas mortales pueden variar de un comprimido a otro, incluso si son del mismo lote. Si usted tiene pastillas que no sean de un proveedor de atención médica con licencia, DEJE de tomarlas.**

Señales de que los comprimidos podrían ser falsos:

- No provienen de un proveedor de atención médica con licencia.
- No están en el embalaje de la prescripción (como un frasco de comprimidos etiquetado).
- Se venden individualmente o en cantidades inusualmente pequeñas.
- Se venden en cantidades inusualmente grandes.

A menudo es difícil determinar si una píldora es legítima o falsificada. A continuación se muestran algunos ejemplos.




## Alprazolam/Xanax®

Se han incautado comprimidos de prescripción falsificados de alprazolam y Xanax® en Ohio.

Píldoras legítimas		Píldoras falsas	Jerga habitual
	Píldora verde marcada con S 90 3.		Zannies
	Píldora azul marcada con B 70 7.		Xan/Zan Bars
	Píldora blanca marcada con G 37 2.		Hulks Ladders
	Píldora amarilla marcada con R 0 3 9.		
	Píldora blanca marcada con XANAX 2.		

## Oxicodona/OxyContin®

Se han incautado comprimidos de prescripción falsificados M 30 y A 215 de oxicodona en Ohio.

Píldoras legítimas		Píldoras falsas	Jerga habitual
	Píldora azul marcada con M 30.		Oxy Roxy
	Píldora azul marcada con A 215.	No hay imagen disponible.	30s

El fentanilo es un analgésico opioide que, en dosis altas, puede causar problemas respiratorios graves o la muerte.

## Señales a las que se debe prestar atención

Los siguientes síntomas podrían ser una señal de que usted o alguien que conoce ha tomado una dosis alta de fentanilo u otro opioide:

- Falta de respuesta/estado de inconsciencia o desmayo.
- No respirar o respiración lenta.
- Labios y uñas que adquieren un mal color.
- Asfixia o tos.
- Piel fría o húmeda.
- Pupilas extremadamente pequeñas.
- Mareo o desorientación.

## Cómo ayudar

La naloxona, también llamada NARCAN®, es un medicamento que puede revertir una sobredosis de opioides y salvar vidas al bloquear los efectos de los opioides en el cerebro y restaurar rápidamente la respiración. La naloxona es segura: Si se administra a alguien que no ha tomado opioides, no causa ningún daño y los profesionales médicos de emergencia han usado naloxona durante más de 40 años.

Nota: La naloxona no puede autoadministrarse.

**Si cree que usted o alguien más está en peligro inmediato, llame al 911.**

En caso de una crisis: Llame al 1-800-662-HELP (4357) o envíe un mensaje de texto con la palabra "4HOPE" al 741741.

*Si usted es testigo de una sobredosis, siempre llame para pedir ayuda, incluso si tiene miedo de ser arrestado. La Ley del Buen Samaritano (Good Samaritan Law) de Ohio lo protege al permitir diferentes niveles de inmunidad para las personas que llaman al 911 durante una sobredosis.*

Emitido por:



Department of Health



# Recomendaciones adicionales

## Para proveedores de atención médica

Debido al aumento de comprimidos de prescripción falsificados que contienen fentanilo y otros componentes potencialmente letales, el Departamento de Salud de Ohio (Ohio Department of Health) hace estas recomendaciones a los socorristas, proveedores de atención médica, profesionales de tratamiento por abuso de sustancias, programas comunitarios del Proyecto DAWN (Muertes evitadas con naloxona) y otras personas que interactúan con personas que consumen drogas ilícitas.

### Ayudar a las personas a tener acceso a y llevar naloxona

Alentar a los pacientes/clientes que consumen drogas ilícitas, así como a sus familiares y amigos, a llevar naloxona. Enviarlos a un programa local de educación y distribución de naloxona basado en la comunidad del Proyecto DAWN o enviarlos a una farmacia local que venda naloxona. Hay más información sobre dónde obtener naloxona disponible en [www.odh.ohio.gov/projectdawn](http://www.odh.ohio.gov/projectdawn). La naloxona también está disponible sin receta en la mayoría de las farmacias de Ohio. Se encuentra disponible una lista de las farmacias de Ohio que ofrecen naloxona en [www.pharmacy.ohio.gov/stopoverdose](http://www.pharmacy.ohio.gov/stopoverdose).

### Administrar naloxona en la sobredosis de drogas cuando se sospecha/indica el uso de drogas no opioides

Aunque la naloxona no es eficaz en el tratamiento de las sobredosis de drogas causadas únicamente por estimulantes como la cocaína y las metanfetaminas, la administración de naloxona puede ser útil en las sobredosis de drogas causadas por una combinación de estimulantes y opioides como el fentanilo y sus análogos.

### Educar a pacientes/clientes que usan sustancias ilícitas sobre los peligros de las drogas mezcladas con fentanilo

Enfatizar el aumento en el riesgo de sobredosis y muerte. En la siguiente columna se pueden encontrar los puntos clave. La información para compartir con los miembros de la comunidad también está disponible en [www.OHAgainstOD.ohio.gov](http://www.OHAgainstOD.ohio.gov).

## Peligros de las drogas ilícitas potencialmente mezcladas con fentanilo

- El fentanilo, en ocasiones, se mezcla con otras drogas sin el conocimiento del usuario.
- El fentanilo es más probable que sea fatal debido a su alta potencia y la duración del tiempo que permanece en el cuerpo.
- Evite mezclar drogas (incluso con alcohol), ya que aumenta el riesgo de sobredosis.
- No use drogas mientras está solo, para que alguien más pueda ayudar/obtener ayuda en el caso de una sobredosis.
- El individuo que consume drogas, así como sus familiares y amigos, deben recibir capacitación sobre los signos y síntomas de una sobredosis de drogas, dónde obtener naloxona, cómo administrarla, cómo hacer respiración de rescate y la importancia de llamar al 911 inmediatamente, incluso cuando se administra naloxona.
- No abandone la ambulancia o el hospital en contra del consejo médico después de que se haya administrado naloxona para revertir la sobredosis. La naloxona puede desaparecer antes de que los opioides desaparezcan y usted podría entrar en sobredosis de nuevo, lo que podría provocar pérdida de conciencia y desaceleración de la respiración o paro respiratorio.

## Colaboradores adicionales

- Miami Valley Regional Crime Lab.
- Ohio State Highway Patrol Crime Lab.
- Lake County Crime Lab.
- Columbus Division of Police Crime Lab.
- Ohio Bureau of Criminal Investigation Drug Chemistry Unit.

## Tratamiento del consumo de sustancias y servicios de salud conductual

Los proveedores de atención médica pueden ayudar a derivar para tratamiento a los pacientes/clientes que usan drogas ilícitas, o los habitantes de Ohio pueden llamar al Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicción de Ohio (Ohio Department of Mental Health and Addiction Services), línea de ayuda gratuita al 1-877-275-6364, disponible de 8 a.m.- 6 p.m., de lunes a viernes.

La junta local de servicios sobre alcohol, drogadicción y salud mental (alcohol, drug addiction and mental health services, ADAMH) en su comunidad también puede ayudar a conectar a los habitantes de Ohio con servicios de salud conductual de bajo costo. Encuentre la junta local ADAMH en [www.mha.ohio.gov/wps/portal/gov/mha/community-partners/adamh-boards](http://www.mha.ohio.gov/wps/portal/gov/mha/community-partners/adamh-boards).

La Ohio CareLine, al 1-800-720-9616, ofrece acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, a profesionales capacitados en salud conductual que pueden ofrecer apoyo confidencial en momentos de crisis personal o familiar, cuando las personas pueden estar luchando para hacer frente a los desafíos en sus vidas. Cuando las personas que llaman necesitan servicios adicionales, recibirán asistencia y conexión con proveedores locales.

Los habitantes de Ohio también puede acceder a los proveedores de tratamiento de salud conductual a través de [www.findtreatment.gov](http://www.findtreatment.gov).

## Recursos adicionales

- Información sobre la obtención de naloxona, incluso de pedido por correo: [odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/known-our-programs/project-dawn/project-dawn-programs](http://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/known-our-programs/project-dawn/project-dawn-programs).
- [U.S. Drug Enforcement Agency \(DEA\) One Pill Can Kill](http://www.dea.gov/onepill): www.dea.gov/onepill.
- [Comunicado de prensa de la DEA sobre los comprimidos de prescripción falsificados](http://www.dea.gov/press-releases/2021/09/27/dea-issues-public-safety-alert): www.dea.gov/press-releases/2021/09/27/dea-issues-public-safety-alert.